

Altresyn®

No. Registro: Q-7378-091



Solución oral para la sincronización del estro en hembras sexualmente maduras



FÓRMULA

Cada 1 mL contiene:

Altrenogest 4.0 mg

Vehículo c.b.p. 1 mL

Forma farmacéutica: Solución oral



INDICACIONES

Se utiliza para la sincronización de estros en cerdas sexualmente maduras.

Cerdas de reemplazo:

Para la sincronización de celo.

Vientres:

Para la sincronización del celo.

Para la mejora en la organización de las unidades de cría, facilitando la gestión de los lotes (asignación de un vientre o grupo de vientres para adaptarse a un nuevo período de cría por lotes).



VÍA DE ADMINISTRACIÓN Y DOSIS

Para uso oral adicionándolo sobre la ración de alimento.

Cerdas de reemplazo:

20 mg de altrenogest / animal, es decir, 5 mL de **ALTRESYN®** por animal una vez al día, durante 18 días consecutivos.

Vientres:

20 mg de altrenogest / animal, es decir, 5 mL de **ALTRESYN®** por animal una vez al día, durante 3 a 18 días consecutivos.

Para preparar el dosificador:

- Colocar la botella en posición horizontal y la boquilla del dosificador dirigirla hacia arriba.
- Presionar lentamente el disparador hasta que aparezca una gota en la punta de la boquilla.

El dosificador suministra una dosis de 5 mL para cada activación completa del disparador. Para la administración regular, mantenga el envase al revés en forma vertical. El dosificador debe permanecer sobre la botella durante todo el periodo en que el producto esté en uso, y el sistema de seguridad deber utilizarse para su almacenamiento entre tratamientos.

Los animales deben ser segregados y dosificados de manera individual. Añadir el producto como un aderezo formando una capa sobre el alimento. Añadir a la parte superior del alimento, inmediatamente antes de la alimentación.



ADVERTENCIAS

Administrar únicamente a cerdas (reemplazos y vientres) sexualmente maduras que ya hayan presentado un celo.

No administrar a animales con infecciones uterinas.

No administrar a machos.

Verificar que se administra la dosis correcta. Una subdosificación puede inducir la formación de folículos quísticos.

Tiempo de retiro: 7 días.

Almacenar entre 15°C y 30°C.

Conservar fuera del alcance de los niños y animales domésticos.



PRESENTACIÓN

Envase de 1080 mL.

