



Suspensión inyectable para uso en lechones



FÓRMULA

Cada mL contiene:

Principios activos:

Toltrazuril 30 mg

Hierro (como Gleptoferrón 355.2 mg)..... 133.4 mg

Excipientes/Vehículo c.s.p./c.b.p. 1 mL

Forma farmacéutica: Suspensión inyectable.



INDICACIONES

Para la prevención simultánea de la anemia por deficiencia de hierro y la prevención de los signos clínicos de la coccidiosis (diarrea) así como la reducción de la excreción de ooquistes en lechones en granjas con antecedentes confirmados de coccidiosis causada por *Cystoisospora suis*.



VÍA DE ADMINISTRACIÓN Y DOSIS

Vía intramuscular detrás de la oreja.

Agitar bien, antes de usar, durante 20 segundos como mínimo.

La dosis recomendada es de 45 mg de toltrazuril combinada con 200 mg de hierro (como complejo gleptoferrón) por lechón (es decir 1.5 mL/animal) en una sola inyección a administrarse a la edad de 1 y 3 días (es decir 24 a 96 horas después del nacimiento).

Con el fin de reducir cualquier reacción adversa, se recomienda una administración lenta del producto.

El tratamiento no debe repetirse.



ADVERTENCIAS

Conservar el producto a temperatura ambiente (15-30 °C).

Agitar bien antes de su uso.

Una vez abierto el envase, el producto puede ser utilizado durante 28 días a una temperatura no mayor a 30 °C y con 75% de humedad relativa.

Mantener fuera del alcance de los niños y animales domésticos.

No administrarse en lechones que se sospeche sufran de deficiencia de vitamina E y/o selenio.

Tiempo de retiro

Carne: 70 días



PRESENTACIÓN

250 mL.

