

Hyogen®

CON Imuvant™

No. Registro: B-7378-095



Bacterina inactivada para la inmunización de cerdos contra infecciones ocasionadas por *Mycoplasma hyopneumoniae*



FÓRMULA

Cada mL contiene:

Cultivo inactivado de *Mycoplasma hyopneumoniae* (min 2.75 U.E.) cepa 2940 combinado con Imuvant™ (adyuvante oleoso J5 propiedad de Ceva) y timerosal como conservador.

Forma farmacéutica: Emulsión inyectable.



INDICACIONES

Para la inmunización de cerdos, contra la neumonía enzoótica porcina, causada por *Mycoplasma hyopneumoniae*.



VÍA DE ADMINISTRACIÓN Y DOSIS

El producto puede ser usado solo o combinado con CIRCovac®

Cuando HYOGEN® se usa solo:

Administrar por vía intramuscular en condiciones asépticas.

- Administrar una dosis única de 2.0 mL a partir de los 21 días de edad
- En caso de infección temprana, es opcional administrar dos veces, una dosis de 1.0 mL, a partir de la primera semana de edad. La segunda dosis se administra con un intervalo de 2 a 3 semanas. Se recomienda administrar en la parte lateral del cuello.

Cuando HYOGEN® se combina con CIRCovac®:

El uso combinado está restringido a la presentación de HYOGEN® de 100 dosis (200 mL) y a la presentación de 100 dosis (50 mL de vacuna reconstituida) de CIRCovac®. La bibliografía del producto CIRCovac® debe ser consultada antes de realizar la mezcla.

Hyogen®	Circovac®
100 dosis (200 mL de vacuna)	100 dosis para lechones (50 mL de suspensión reconstituida + emulsión)

Los dispositivos de la vacuna deben ser usados en condiciones asépticas en conformidad con las instrucciones de los dispositivos proporcionados por el fabricante.

Prepare CIRCovac® agitando de forma vigorosa el vial de suspensión de antígeno e inyectando su contenido en el vial de emulsión que contiene el adyuvante.

Mezcle 50 mL de CIRCovac® preparado, con 200 mL de HYOGEN® y agite suavemente hasta obtener una emulsión blanca y homogénea.

Dosis:

Administre una dosis de 2.5 mL de la mezcla mediante inyección intramuscular, a partir de las 3 semanas de edad.

Use toda la mezcla de la vacuna inmediatamente después del mezclado.

Para la administración de dos dosis, se deben alternar los lados del cuello.

Hyogen®

CON Imuvant™

No. Registro: B-7378-095



Bacterina inactivada para la inmunización de cerdos contra infecciones ocasionadas por *Mycoplasma hyopneumoniae*



ADVERTENCIAS

Conservar en refrigeración entre 2 y 8 °C. No congelar. Conservar fuera del alcance de los niños y animales domésticos.

Agite bien el envase y mantener la vacuna a temperatura ambiente (15 a 25 °C) antes de su uso.

En caso de inyección accidental por el operador, consultar al médico de manera inmediata.



PRESENTACIÓN

100 y 200 mL.



Elaborado por:
CEVA-PHYLAXIA, Hungría
contactoah@ceva.com
(55) 53 62 1800.

IMPORTADO Y DISTRIBUIDO POR:
Ceva Salud Animal, S.A. de C.V.
Ciudad de México

USO VETERINARIO • CONSULTE AL MEDICO VETERINARIO • SU VENTA REQUIERE RECETA MÉDICA