



Antibiótico de amplio espectro



FÓRMULA

Cada 100 mL contienen:

Amoxicilina (trihidrato) 15 g
Vehículo c.b.p. 100 mL

Forma farmacéutica: Suspensión Inyectable



INDICACIONES

Para el tratamiento de las infecciones de los cerdos y los bovinos causadas por:

Bacillus anthracis, *Bordetella bronchiseptica*, *Clostridium perfringens*, *Corynebacterium pyogenes*, *Erysipelothrix rhusiopathiae*, *Escherichia coli*, *Haemophilus parasuis*, *Listeria monocytogenes*, *Pasteurella multocida*, *Mannheimia haemolytica* (antes *Pasteurella*), *Proteus mirabilis*, *Salmonella spp.*, *Serpulina hyodysenteriae*, *Shigella spp.*, *Staphylococcus spp.*, *Streptococcus spp.* y otros microorganismos sensibles a la Amoxicilina.



VÍA DE ADMINISTRACIÓN Y DOSIS

Intramuscular mediante inyección en la masa muscular del cuello o glúteo.

Bovinos y cerdos: Administrar 15 mg de amoxicilina por kg de peso, equivalente a 1 mL de **Vetrimoxin® L.A.** por 10 kg de peso corporal. Repetir la dosis a las 48 horas.



ADVERTENCIAS

Mantener en un lugar fresco, seco y protegido de la luz solar. Agitar el producto antes de usarlo.

Conservar fuera del alcance de los niños y animales domésticos.

Período de retiro:

Bovinos:

Carne: 14 días

Leche: 3 días

Porcinos:

Carne: 16 días



PRESENTACIÓN

250 mL.

