



Bacterina Inactivada con toxoides en solución contra infecciones ocasionadas por *Actinobacillus pleuropneumoniae*



FÓRMULA

Cada dosis contiene:
Cultivos de *Actinobacillus pleuropneumoniae*, cepas NT3, PO, U3, B4 y Sz-II y sus toxoides APX I, II y III con un título mínimo antes de la inactivación de $20 \times 10^{9.0}$ UFC/dosis.

Forma farmacéutica: Suspensión inyectable.



INDICACIONES

COGLAPIX® está indicado para la inmunización activa de los porcinos contra la pleuroneumonía causada por *Actinobacillus pleuropneumoniae* en piaras donde la enfermedad crónica o aguda causa pérdidas.

COGLAPIX® contiene antígenos somáticos y toxoides APX I, II y III de *Actinobacillus pleuropneumoniae*.



VÍA DE ADMINISTRACIÓN Y DOSIS

Intramuscular (en la tabla del cuello)

Administrar 2 mL / animal, como primera vacunación desde las 7 semanas de edad.

Revacunar 2 a 3 semanas después de la vacunación inicial.



ADVERTENCIAS

Administrar sólo en animales sanos. Utilizar equipo para inyección estéril, respetar las condiciones normales de asepsia. Agitar bien el producto antes de usarse. Usar el contenido total del frasco. Disponer de frascos vacíos y restos de vacuna, de acuerdo con la normatividad local o nacional. En caso de inyección accidental en el operador, atención médica urgente es necesaria.

Conservar en refrigeración entre 2 y 8 °C.

Evitar la exposición directa a la luz solar.

No congelar.

Conservar fuera del alcance de los niños y animales domésticos.



PRESENTACIÓN

100 mL.

