



Para la inmunización de cerdos contra *Mycoplasma hyopneumoniae* y circovirus porcino tipo 2



FÓRMULA

Una dosis (2 mL) contiene:

Sustancias activas:

Mycoplasma hyopneumoniae, cepa 2940, inactivado

..... mín. 184 UA*

Circovirus porcino tipo 2d, proteína de la cápside

ORF2** mín. 19.6 µg

Adyuvante: parafina líquida ligera.

Forma farmacéutica: emulsión inyectable.



INDICACIONES

Para la inmunización activa de cerdos a partir de las 3 semanas de edad, contra *Mycoplasma hyopneumoniae* y la infección por circovirus porcino tipo 2 (PCV2).



VÍA DE ADMINISTRACIÓN Y DOSIS

Vacune a los cerdos por la vía intramuscular en el cuello. Una sola dosis de 2 mL, en cerdos a partir de las 3 semanas de edad.



ADVERTENCIAS

Almacene y transporte refrigerado (2°C- 8°C), protegido de la luz.

No congelar.

Almacene en el envase original.

Protéjalo de la luz.

Conservar fuera del alcance de los niños y animales domésticos.



PRESENTACIÓN

Frasco 50 dosis (100 mL)



*UA: Unidades de antígeno medido en prueba de potencia (ELISA)

** El antígeno recombinante de circovirus porcino tipo 2d (proteína de la cápside ORF2) se auto ensambla en partículas similares al virus (VLPs, por sus siglas en inglés virus-like particles).