



Control superior de PCV2. Rendimiento mejorado. Comprobado en condiciones de campo brasileñas.

Resumen

Llevado a cabo en un sistema comercial de cría completa en Brasil, donde PCV2d era el genotipo circulante dominante, esta evaluación de campo comparó CIRBLOC® M Hyo con una vacuna RTU de PCV2a y *M. hyo* en aproximadamente 1,470 lechones.

- Ensayo de campo comparativo en las etapas de maternidad, destete y engorda.
- Grupos paralelos aleatorizados según el orden de parto y el tamaño de la camada
- Ambos grupos alojados en la misma sala bajo condiciones ambientales y de manejo idénticas
- Se tomaron muestras de sangre para evaluar la respuesta serológica y la viremia

Grupo	Dosis	Edad de los lechones	Nº Animales
 Group 1 CIRBLOC® M Hyo	2 mL (IM) - 1 dosis	3 semanas	765
 Group 2 Vacuna PCV2a & <i>M. hyo</i> RTU	2 mL (IM) - 1 dosis	3 semanas	705

Beneficio clave de CIRBLOC® M Hyo



Salud

- Respuesta serológica al PCV2 más fuerte frente a RTU
- Menor viremia de PCV2 a partir de las 6 semanas de edad
- Viremia de PCV2 negativa a partir de las 16 semanas de edad
- Menores cargas virales en tejidos linfoides y pulmonares



Rendimiento

- +1,03 kg de mayor peso corporal final
- -0.04 tasa de conversión de alimento (destete a engorde)



Economía

+€2,02 de ingreso neto por cerdo

Figura 1. CIRBLOC® M Hyo indujo una respuesta serológica significativamente más fuerte en comparación con los cerdos vacunados con RTU




Figura 2. Mejor control de la viremia de PCV2 frente a la vacuna combinada PCV2a M. hyo lista para usar (RTU)





Figura 3. Las cargas virales en los tejidos linfoides y muestras de pulmón fueron significativamente más bajas en el grupo CIRBLOC® M Hyo group



Mensaje clave

CIRBLOC® M Hyo basado en una cepa PCV2d, ofrece un mejor control de la infección por PCV2 y se traduce en beneficios medibles en rendimiento y económicos en condiciones de campo subclínicas.

Para más detalles, consulte el SPC aplicable en su país. Este documento contiene información sobre un producto biológico veterinario que se vende en varios países y áreas, donde puede comercializarse bajo diferentes nombres comerciales y de acuerdo con distintas aprobaciones regulatorias. Por lo tanto, Ceva no garantiza que los detalles presentados sean correctos para todos los lugares. Además, los datos de seguridad y eficacia y los periodos de espera pueden ser diferentes según las regulaciones locales. Por favor, consulte a su veterinario para más información.

CIRBLOC® M Hyo: Para la inmunización de cerdos contra *Mycoplasma hyopneumoniae* y circovirus porcino tipo 2. **Especies de destino:** Porcino. **Indicaciones de uso:** Para la inmunización activa de cerdos para reducir: la viremia, la carga viral en pulmones y tejidos linfoides, la excreción del virus causada por la infección por circovirus porcino tipo 2 (PCV2), la gravedad de las lesiones pulmonares causadas por la infección por *Mycoplasma hyopneumoniae*, la pérdida en la ganancia de peso corporal. **Dosis y vías de administración:** Vía intramuscular. Vacunar a los cerdos en el cuello. Una dosis única de 2 mL en cerdos a partir de las 3 semanas de edad. **Precauciones para el almacenamiento:** Almacene y transporte refrigerado (2°C - 8°C), protegido de la luz. No congelar. Almacene en el envase original. Protéjalo de la luz. Conservar fuera del alcance de los niños y animales domésticos.

No. Registro: B-7378-151



Juntos, más allá de la Salud Animal

